


KIEHL Desinet-Compact Overfladedesinfektion

25 ML – VARENUMMER: 8050



PRODUKTBEKRIVELSE

Effektivt middel til både rengøring og desinficering af vandbestandige overflader i professionelle miljøer som fitnesscentre, institutioner og kantiner. Koncentrat, der leveres i portionsposer for præcis dosering og minimalt spild.

EGENSKABER

Koncentrat uden parfume. Doseres 25 ml (1 pose) pr. 5 liter vand. 80 portionsposer pr. pakke.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Varenummer: 8050

Enhed: 25 ml – 80 portionsposer pr. pakke

Type: Overfladedesinfektion (koncentrat)

Dosering: 25 ml pr. 5 liter vand

Parfume: Uden

Anvendelse: Vandbestandige overflader

Kiehl-Desinet-compact Konsentrat

Flydende aldehyd-frit desinfektionsrengøringsmiddel,

Egenskaber

Til rengøring og desinfektion af vandbestandige gulve, vægge, møbler og andet inventar i hygienerrelevante områder.

Anvendelse: Før anvendelse testes på et ikke synligt sted.

1 Dosierung = 25 ml.

Daglig rengøring: Dosering : Se tabellen.

Klargøring af brugsopløsning

Blandes altid med koldt vand. Dosering, se tabeller. 2-L- und 5-L-dunke blandes via doseringssystem.

Desinficerende rengøring

Overfladen med desinfektionsopløsningen gøres våd (ca. 15 – 20 ml/m²) og bearbejdes med rengørings tekstil eller rengøringsmaskinemaskine

Forbrug: 0,1 ml/m².

Overflader og køkkenmaskiner der kommer i direkte kontakt med fødevarer skylles efter med rigeligt rent vand efter virketiden.

Indhold: (iht 648/2004/EG)

Nonioniske Tensider 5-15%, Vandopløselige opløsningsmidler, Biocider

pH-værdi (Koncentrat): ca. 9,5.

pH-værdi(Brugsopløsning): ca. 7,5

Aktivstof pr 100 g:

10,0 g Didecyldimethylammoniumchlorid (CAS: 7173-51-5), 11,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (CAS: 2372-82-9), 14,5 g

Phenoxyethanol (CAS: 122-99-6).

Faremærkning (i Koncentrat): GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, Gefahr. H302 Farlig ved indtagelse. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp
Indeholder: Didecyldimonium chloride / Laurylamine dipropylenediamine (INCI)

Artikelnummer	Forpakningsenhed (FPE)	FPE pr palle
j350354	240 x 25 ml Doseringspose (Karton)	72
j350308	3 x 2 L Flasker (Karton)	130
j350305	2 x 5 L Dunke (Karton)	56

Doseringsanbefaling til overfladedesinfektion i sundhedsvæsenet

Testkriterier	Virkespektrum	Belastning	Dosering	Virketid	Test imod
EN 16615 / 4-Felttest VAH-Certificeret anvendelsesanbefaling til overfladedesinfektion med mekanik EN 14476	baktericid levurocid begrænset virucid*	Høj	0,5 % (50 ml/ 10L vand)	60 Min.	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa Candida albicans Modificeret Vacciniavirus Ankara (MVA)
Doseringsanbefaling for overfladedesinfektion i levnedsmiddelområdet					
EN 13697 Overfladedesinfektion uden mekanik. VAH/DGHM 14.1 EN 14476	baktericid levurocid begrænset virucid*	Høj	0,5 % (50 ml/10 L vand)	60 Min.	Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa Candida albicans Modificeret Vacciniavirus Ankara (MVA)
Øvrige tests					
Medicinsk område					
EN 16615 baktericid	baktericid levurocid	Høj	0,5 % (50 ml/10 L vand)	15 Min.	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa Candida albicans
EN 13727 kvantitativ Suspensionsforsøg	baktericid	Høj	0,5 % (50 ml/10 L vand)	1 Min.	Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa
EN 13624 kvantitativ Suspensionsforsøg	levurocid	Høj	0,5 % (50 ml/10 L vand)	5 Min.	Candida albicans
Virucid					
EN 14476	Begrænset virucid*	Lav	0,25 % (25 ml/10 L vand)	1 Min	Modificeret Vaccinia virus Ankara (MVA)
			0,5 % (50 ml/10 L vand)	1 Min.	
		Høj	0,5 % (50 ml/10 L vand)	60 Min.	

DVV/RKI Kvantitativ Suspensionsforsøg	Begrænset virucid*	Med og uden	0,25 % (25 ml/10 L vand)	30 Min.	BVDV (Surrogat for HCV), Vacciniavirus Murines Norovirus (MNV) Rotavirus
		Med og uden	2 % (200 ml til 10 l vand)	120 Min.	
		uden	0,25 % (25 ml/10 L vand)	15 Min.	
industriel, institutionel og Levnedsmiddelområdet					
EN 1276 Kvantitativ Suspensionsforsøg	baktericid	Høj	0,5 % (50 ml/10 L vand)	1 Min.	Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa
EN 1650 Kvantitativ Suspensionsforsøg	levurocid	Høj	0,5 % (50 ml/10 L vand)	5 Min.	Candida albicans

*jvf. RKI-anbefalinger Bundesgesundheitsblatt 01-2004, se også www.iho-viruzidie-liste.de og www.iho-desinfektionsmittelliste.de